

## EA EAOAP 2017 – GABARITO OFICIAL

### CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS: ENFERMAGEM

VERSÃO A	
QUESTÃO	GABARITO
31	B
32	C
33	A
34	B
35	A
36	#
37	#
38	B
39	B
40	B
41	A
42	C
43	#
44	B
45	C
46	C
47	B
48	B
49	B
50	C
51	B
52	C
53	B
54	A
55	C
56	C
57	B
58	#
59	D
60	#

VERSÃO B	
QUESTÃO	GABARITO
31	C
32	B
33	B
34	B
35	C
36	B
37	C
38	B
39	A
40	C
41	C
42	B
43	#
44	D
45	#
46	B
47	C
48	A
49	B
50	A
51	#
52	#
53	B
54	B
55	B
56	A
57	C
58	#
59	B
60	C

- A questão com # foi anulada.
- As demais questões permaneceram inalteradas.

## **JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DA QUESTÃO**

### **36 VERSÃO A / 51 VERSÃO B**

De acordo com a obra de referência, recomenda-se a coleta da amostra “antes de iniciar” a antibioticoterapia, e não “logo após” o início da antibioticoterapia, como apresentado na assertiva I. Todavia, a assertiva II - "Evitar contaminação da pele e mucosas (incluir microbiota resistente)" está incorreta, pois, conforme a obra de referência, recomenda-se "excluir microbiota resistente". Nesses termos, tem-se apenas as assertivas III e IV como corretas.

### **37 VERSÃO A / 52 VERSÃO B**

Há inadequação da assertiva III, pois, segundo a obra de referência, tem-se que: "O pH menor que 4,1 é considerado ácido e, dessa forma, causa graves alterações histológicas nos vasos endoteliais, podendo inclusive ocasionar flebites." (E não "pH maior", como apresentado na questão).

Quanto à assertiva IV, segundo a obra de referência, tem-se que: "Quando se administra uma medicação que tem pH diferente do normal do nosso corpo (7,35 ou 7,45), o sangue ajuda a equilibrá-lo, aproximando o pH da medicação ao do fisiológico." (E não "afasta o pH da medicação do pH fisiológico", como apresentado na questão).

Quanto às assertivas I e II, estão de acordo com a obra de referência: A faixa do pH de uma medicação em particular pode variar por causa de diferentes composições e fármacos utilizados. [...] O pH das soluções e medicações mostra seus níveis de acidez ou alcalose. Esses valores podem indicar se há tendência de ocorrer irritação dos vasos sanguíneos. Considerando o pH 7 como fisiológico e não irritativo, deve-se buscar a manutenção do pH das infusões entre 5 e 9, para que se minimize o rompimento dos vasos endoteliais. Assim, não há alternativa que atenda ao comando da questão.

### **43 VERSÃO A / 58 VERSÃO B**

Na coluna da direita, há descrições pertinentes a Antibióticos, Antissépticos e Protetores, respectivamente. O termo “Protetores” não consta na coluna da esquerda para ser associado, não havendo, portanto, alternativa correta.

### **58 VERSÃO A / 43 VERSÃO B**

A única vacina recomendada para uma criança de um mês de vida é a vacina contra a Hepatite B. Outros tipos de vacina, segundo a referência de base discriminada no Edital: BRASIL. Fundação Nacional da Saúde. *Manual de Normas de Vacinação*. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 72 p., como a vacina DTP (tríplice bacteriana), são recomendados somente a partir de dois meses.

### **60 VERSÃO A / 45 VERSÃO B**

A falta de informações no enunciado dificultou a compreensão da questão e a sua resolução. Tendo em vista a ausência de dados suficientes sobre a finalidade da biópsia de tecido, se para cultura ou histopatológico, impossibilitou-se a resolução da questão.